

# 护理学模拟试卷

## 一、单项选择题(只有一个选项符合题目要求。每题 1 分,共 20 分)

- 1、在进行沟通时,影响沟通并使双方产生不信任感的行为是( )
  - A. 双眼注视对方
  - B. 全神贯注倾听
  - C. 倾听中特别注意对方的弦外音
  - D. 言语简单明确
  - E. 及时评论对方所谈内容
- 2、阻塞性肺气肿患者胸廓呈( )
  - A. 漏斗胸
  - B. 鸡胸
  - C. 桶状胸
  - D. 扁平胸
  - E. 一侧胸廓局限性膨隆
- 3、夜班护士发现一支气管扩张病人咳血约 200ml 后突然中断,呼吸极度困难,喉部有痰鸣音,表情恐怖,两手乱抓,首先要做的是( )
  - A. 立即通知医师
  - B. 立即气管插管
  - C. 清除呼吸道积血
  - D. 给予氧气吸入
  - E. 应用呼吸兴奋剂
- 4、引起细菌性咽扁桃体炎最主要的致病菌为( )
  - A. 葡萄球菌
  - B. 溶血性链球菌
  - C. 肺炎球菌
  - D. 肺炎杆菌
  - E. 大肠杆菌
- 5、在为内科疾病病人运用护理程序进行护理时,其中哪一步可以发现新问题,作出新诊断、新计划或修订原有方案( )
  - A. 评估
  - B. 诊断
  - C. 计划
  - D. 实施
  - E. 评价
- 6、穿无菌手术衣和戴无菌手套后其无菌区为( )

- 
- A. 肩、背、前胸、手部
  - B. 肩部及腰部以上
  - C. 前胸、手臂、腰部以上
  - D. 肩部、背、腰部以下
  - E. 前胸、臂部以上腰部以下

7、实践证明用于食管癌普查最好的方法为（ ）

- A. 气钡双重造影
- B. 常规食管吞钡透视
- C. 食管镜
- D. 食管拉网脱落细胞学检查
- E. 血清学检查

8、开放性气胸急救处理是（ ）

- A. 清创及胸腔闭式引流
- B. 抗菌素注射
- C. 吸氧, 输血, 补液
- D. 封闭胸壁伤口
- E. 胸腔穿刺

9、食管癌的典型症状是（ ）

- A. 进行性消瘦
- B. 进行性吞咽困难
- C. 进食不畅伴呕吐
- D. 间歇性胸痛
- E. 低热及贫血

10、肛裂“三联征”是指（ ）

- A. 疼痛、便秘和出血
- B. 肛裂、出血、前哨痔
- C. 疼痛、出血、前哨痔
- D. 便秘、出血、前哨痔
- E. 溃疡裂隙、前哨痔、肥大的肛乳头

11、颈动脉明显搏动主要见于（ ）

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 三尖瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 二尖瓣狭窄

12、一患者患高血压病 5 年，近日出现尿蛋白，应诊断为（ ）

- A. 高血压病 I 期
- B. 高血压病 II 期

- C. 高血压病Ⅲ期
- D. 肾小球肾炎
- E. 肾功能衰竭

13、应用（ ）药物时，应注意避光。

- A. 静脉点滴硝酸甘油
- B. 静脉点滴青霉素
- C. 静脉点滴苯胺唑啉
- D. 静脉点滴硝普钠
- E. 静脉点滴头孢

14、正常窦性心律速率为（ ）

- A. 45次/分—60次/分
- B. 100次/分—160次/分
- C. 60次/分—100次/分
- D. >160次/分
- E. 45次/分—100次/分

15、医疗器械用高压蒸汽灭菌，一般需要维持的温度和时间分别是（ ）

- A. 115℃，15—30min
- B. 121℃，10—15 min
- C. 121℃，15—30min
- D. 115℃，20—30 min
- E. 100℃，10—15 min

16、昏迷病人插胃管为提高成功率应注意（ ）

- A. 插管前将下颌贴近胸骨柄，至会厌时头后仰，缓慢插入
- B. 插管前头后仰，至会厌时托起头部下颌贴近胸骨柄，缓慢插入
- C. 选择较细的胃管
- D. 增加胃管润滑的长度
- E. 选较硬的胃管

17、糖尿病最严重的急性并发症是（ ）

- A. 糖尿病足
- B. 心血管病变
- C. 肾血管病变
- D. 糖尿病高渗性酮症昏迷
- E. 神经病变

18、下列属于小细胞低色素性贫血的是（ ）

- A. 再生障碍性贫血
- B. 溶血性贫血
- C. 缺铁性贫血
- D. 急性白血病

E. 急性失血性贫血

19、目前认为先心病的病因主要是（ ）

- A. 胎盘早剥
- B. 前置胎盘
- C. 宫内病毒感染
- D. 宫内支原体感染
- E. 宫内细菌感染

20、盆腔炎症术后采取半坐卧位的目的是（ ）

- A. 有利于向站立过渡
- B. 减轻肺部淤血和心脏负担
- C. 减少炎症的扩散和毒素吸收
- D. 减轻局部出血
- E. 使静脉回流减少

## 二、多项选择题(每题 2 分，共 20 分)

21、抗休克的基本措施包括（ ）

- A. 消除病因
- B. 扩张血容量
- C. 纠正酸碱失衡
- D. 调节周围血管张力
- E. 吸入氧气

22、消化性溃疡常见的并发症有（ ）

- A. 出血
- B. 急性穿孔
- C. 幽门梗阻
- D. 癌变
- E. 感染

23、腹泻所致低钾血症补钾时，下列哪项正确（ ）

- A. 见尿补钾
- B. 氯化钾浓度 $<0.3\%$
- C. 可以静脉推注
- D. 滴速控制在 30—60 滴每分钟
- E. 每日氯化钾最多不超过 6—8 克

24、疾病的概念是（ ）

- A. 机体的一定部位的功能、代谢、形态结构的变化
- B. 是机体损伤与抗损伤的整体病理过程
- C. 是机体内外环境平衡破坏
- D. 机体劳动力限制或丧失
- E. 不仅仅躯体上，而且也包括精神、心理方面的异常

25、压力所造成的生理反应有（ ）

- A. 心跳加快
- B. 呼吸加快
- C. 胃液分泌增加
- D. 血压下降
- E. 免疫力增强

26、手术后切口感染的原因是（ ）

- A. 未按照要求备皮
- B. 手术时组织损伤多
- C. 切口血肿形成
- D. 术前未使用抗生素
- E. 病人抵抗力降低

27、下列哪些情况可能发生急性乳房炎（ ）

- A. 哺乳次数过多
- B. 乳头发育不良
- C. 乳管不通畅
- D. 乳汁分泌障碍
- E. 婴儿口含乳头睡眠

28、颅前窝骨折可出现下列哪些表现（ ）

- A. 鼻漏
- B. 耳漏
- C. “熊猫眼”征
- D. 耳后、乳突部淤血斑
- E. 听神经损伤

29、冷疗法的目的是（ ）

- A. 减轻局部充血或出血
- B. 减轻疼痛
- C. 控制炎症扩散
- D. 降低体温
- E. 活血化瘀

30、结核分枝杆菌可通过（ ）进行传染。

- A. 呼吸道
- B. 消化道
- C. 尿道
- D. 血液
- E. 胆道



### 三、判断题（对的划“√”，错的划“×”。每题2分，共20分）

- 31、风湿性心脏瓣膜病致死的主要原因是心力衰竭。（ ）
- 32、病人出现黑便提示每日出血量为250—300ml。（ ）
- 33、以连线法取肌肉注射部位的定位法是髂前上棘和尾骨连线外下1/3处。（ ）
- 34、每日2次的外文缩写是bid。（ ）
- 35、肝性脑病病人在烦躁不安时，应给予巴比妥镇静。（ ）
- 36、原发性高血压与病毒感染有关。（ ）
- 37、心功能III级的病人体力活动明显受限，休息时无症状，轻微的活动即可引起乏力、心悸、呼吸困难或心绞痛等症状。（ ）
- 38、十二指肠球部溃疡的疼痛规律为进食—疼痛—缓解。（ ）
- 39、高压蒸汽灭菌的纱布敷料、棉球打开未用完，最长保存期为24小时。（ ）
- 40、肝硬化大量放腹水时，易于诱发肝昏迷。（ ）

### 四、名词解释（每题3分，共15分）

- 41、食物的特殊动力作用：
- 42、阴道自净作用：
- 43、尿路刺激征：
- 44、等渗性缺水：
- 45、基础体温：

### 五、简答题（每题5分，共25分）

1. 促进呼吸系统疾病病人有效排痰的措施有哪些？
2. 保护性隔离的主要措施有哪些？
3. 试述洋地黄毒性反应的表现及中毒的处理。

---

4. 简述急性阑尾炎术后并发症。

5. 简述病案的书写要求。

