

# 卫生和医学基础知识

A 型题(下列各题中, 只有一个符合题意的正确选项。)

1. 胸骨角两侧平对( )
  - A. 第5肋
  - B. 第4肋
  - C. 第3肋
  - D. 第2肋
  - E. 第1肋
2. 休克时正确的补液原则是( )
  - A. 补液“宁多勿少”
  - B. “需多少, 补多少”
  - C. 补充丧失的部分液体和当天继续丧失的液体
  - D. “失多少, 补多少”
  - E. 如血压正常不必补液
3. DIC 产生的贫血属( )
  - A. 溶血性贫血
  - B. 缺铁性贫血
  - C. 中毒性贫血
  - D. 失血性贫血
  - E. 再生障碍性贫血
4. 一般在服毒后几小时内洗胃抢救最有效( )
  - A. 48小时内
  - B. 24小时内
  - C. 12小时内
  - D. 8小时内
  - E. 4~6小时内
5. 肉瘤是由( )
  - A. 神经组织来源的恶性肿瘤
  - B. 间叶组织来源的良性肿瘤
  - C. 间叶组织来源的恶性肿瘤
  - D. 上皮组织来源的良性肿瘤
  - E. 上皮组织来源的恶性肿瘤
6. 诊断消化性溃疡最可靠的方法是( )
  - A. 根据临床症状

- 
- B. 测胃酸
  - C. 钡餐
  - D. 胃镜
  - E. 大便隐血试验

7. 降压反射的生理意义主要是( )

- A. 降低动脉血压
- B. 升高动脉血压
- C. 增强心血管活动
- D. 减弱心血管活动
- E. 维持动脉血压相对恒定

8. 门静脉由( )

- A. 肠系膜上静脉和脾静脉汇合而成
- B. 肠系膜下静脉和脾静脉汇合而成
- C. 脾静脉和胃左静脉汇合而成
- D. 脾静脉和胃右静脉汇合而成
- E. 肠系膜上静脉和胃左静脉汇合而成

9. 有关基础代谢的描述, 错误的是( )

- A. 与正常平均值相差 $\pm(10\% \sim 15\%)$ 属于正常
- B. 临床用相对值表示
- C. 反映人体最低的能量代谢水平
- D. 儿童高于成人
- E. 在基础状态下测定

10. 抗利尿激素的作用主要是( )

- A. 保钠、排钾、保水
- B. 促进近曲小管对水的重吸收
- C. 提高内髓部集合管对尿素的通透性
- D. 增强髓袢升支粗段对 NaCl 的主动重吸收
- E. 促进远曲小管、集合管对水的重吸收

11. 半抗原是指( )

- A. 既有免疫原性, 又有抗原性
- B. 具有抗原性, 而没有免疫原性
- C. 具有免疫原性, 而没有抗原性
- D. 既没有免疫原性, 也没有抗原性
- E. 与蛋白质载体结合后, 可获得抗原性

12. 下列属于营养必需脂肪酸的是( )

- A. 油酸
- B. 亚麻酸
- C. 软脂酸
- D. 硬脂酸
- E. 十二碳脂肪酸

13. 吸气性呼吸困难时，下列哪项叙述不正确( )

- A. 吸气费力
- B. 呼气时伴有哮鸣音
- C. 常伴有干咳
- D. 高调吸气性喉鸣
- E. 重者出现吸气时“三凹征”

14. 清创术下列操作哪项是错误的( )

- A. 伤口周围油污应用松节油擦去
- B. 伤口周围皮肤用碘酒、酒精消毒
- C. 切除失去活力的组织和明显挫伤的创缘组织
- D. 深部伤口不宜再扩大
- E. 用无菌生理盐水或双氧水冲洗伤口

15. 女性骨盆的特点是( )

- A. 骨盆上口近似心形
- B. 骨盆下口较狭小
- C. 骨盆腔呈漏斗形
- D. 耻骨下角为 $80^{\circ} \sim 100^{\circ}$
- E. 以上描述均不对

16. 下列反射中，属于条件反射的是( )

- A. 排尿反射
- B. 食物刺激口腔黏膜引起唾液分泌
- C. 膝跳反射
- D. 望梅止渴
- E. 减压反射

17. 头痛进行性加重并有颅内压增高见于( )

- A. 颈椎病
- B. 脑震荡
- C. 脑肿瘤
- D. 神经官能症
- E. 以上均不对

18. 柏油样大便表示上消化道出血量超过( )

- 
- A. 30mL
  - B. 60mL
  - C. 100mL
  - D. 300mL
  - E. 500mL

19. 不属于肝门的结构是( )

- A. 肝固有动脉
- B. 肝静脉
- C. 肝门静脉
- D. 肝左管
- E. 肝右管

20. 胆固醇在体内不能转变生成的是( )

- A. 维生素 D
- B. 胆汁酸
- C. 胆色素
- D. 雌二醇
- E. 睾丸酮

21. 组织兴奋后处于绝对不应期时, 其兴奋性为( )

- A. 无限大
- B. 大于正常
- C. 等于正常
- D. 小于正常
- E. 零

22. 下列关于隐匿性肾小球肾炎的叙述, 错误的是( )

- A. 可无蛋白尿
- B. 可无血尿
- C. 无高血压
- D. 无水肿
- E. 肾病理肾小球无异常

23. 急性持续性腹痛阵发性加剧伴休克, 最可能的疾病是( )

- A. 急性阑尾炎
- B. 绞窄性肠梗阻
- C. 泌尿系结石, 肾绞痛
- D. 外伤性肝破裂
- E. 急性单纯性肠梗阻

24. 肾细胞癌最常见的病理组织学类型是( )

- A. 乳头状癌
- B. 透明细胞癌

- C. 嫌色细胞癌
- D. 集合管癌
- E. 未分化癌

25. 声波传入内耳最主要的途径是( )

- A. 颅骨→颞骨中耳蜗内淋巴
- B. 外耳道→鼓膜→听骨链→卵圆窗膜→耳蜗
- C. 外耳道→鼓膜→听骨链→圆窗膜→耳蜗
- D. 外耳道→鼓膜→鼓室空气→圆窗膜→耳蜗
- E. 外耳道→鼓膜→颞骨中耳蜗内淋巴

26. 体内运转一碳单位的载体是( )

- A. 叶酸
- B. 生物素
- C. 维生素 B<sub>12</sub>
- D. 四氢叶酸
- E. S-腺苷蛋氨酸

27. 引起原发性颗粒性固缩肾的最主要病变是( )

- A. 部分肾小球纤维化
- B. 肾间质纤维组织增生
- C. 肾间质淋巴细胞浸润
- D. 入球小动脉玻璃样变性
- E. 部分肾小球代偿性肥大

28. 骨折愈合过程中不出现( )

- A. 血肿
- B. 肉芽组织
- C. 软骨骨痂
- D. 病理性钙化
- E. 骨性骨痂

29. 下列选项中,能有效刺激促红细胞生成素血浆含量增加的是( )

- A. 缺 O<sub>2</sub>
- B. CO<sub>2</sub>潴留
- C. 雌激素
- D. 肾疾患
- E. 再生障碍性贫血

30. 脂褐素大量增加最常见于( )

- A. 细胞萎缩
- B. 细胞坏死

- C. 细胞凋亡
- D. 细胞水样变性
- E. 细胞玻璃样变性

31. 肌肉的初长度取决于( )

- A. 被动张力
- B. 前负荷
- C. 后负荷
- D. 前负荷与后负荷之和
- E. 前负荷与后负荷之差

32. 患者进行器官移植时可能提供最佳 HLA 配型的人群是( )

- A. 患者父母
- B. 患者妻子
- C. 患者子女
- D. 患者同胞兄弟姐妹
- E. 患者的表兄弟姐妹

33. 血液白细胞中数量最多的是( )

- A. 单核细胞
- B. 中性粒细胞
- C. 嗜碱性粒细胞
- D. 嗜酸性粒细胞
- E. T 淋巴细胞

34. 下列器官对缺氧的耐受性由强到弱依次为( )

- A. 脑、肝、肾
- B. 肾、肝、脑
- C. 肝、脑、肾
- D. 肝、肾、脑
- E. 肾、脑、肝

35. 血管壁玻璃样变性多见于( )

- A. 大动脉
- B. 中动脉
- C. 细动脉
- D. 大静脉
- E. 小静脉

36. 心肌梗死时的附壁血栓属于( )

- A. 透明血栓

- B. 白色血栓
- C. 混合性血栓
- D. 红色血栓
- E. 延续性血栓

37. 慢性浅表性胃炎的主要病变特点是( )

- A. 胃黏膜变薄
- B. 胃黏膜水肿
- C. 可见黏膜下血管
- D. 淋巴细胞、浆细胞浸润胃黏膜浅层
- E. 胃黏膜糜烂

38. 氯化钾静滴浓度不得超过( )

- A. 0.1%
- B. 0.3%
- C. 0.6%
- D. 0.9%
- E. 1.2%

39. 最适于进行输卵管结扎术的时间是( )

- A. 月经来潮前3~4天
- B. 足月产后4天
- C. 难产后72天
- D. 人流后3天
- E. 月经后3~4天

40. 羊水过少是指妊娠晚期羊水量少于( )

- A. 500mL
- B. 400mL
- C. 300mL
- D. 200mL
- E. 100mL

41. 早期妊娠的确诊依据是( )

- A. 停经史
- B. 早孕反应
- C. 尿妊娠试验
- D. 黑加征
- E. B型超声检查

42. 试验研究中, 对照组与实验组发病率之比为( )

- A. 有效率
- B. 治愈率
- C. 生存率

- D. 保护率
- E. 效果指数

43. 浦肯野细胞不具有下列哪项生理特性( )

- A. 兴奋性
- B. 自律性
- C. 传导性
- D. 收缩性
- E. 有效不应期长

44. 我国法定传染病中，甲类传染病包括( )

- A. 天花和鼠疫
- B. 狂犬病和天花
- C. 霍乱和副霍乱
- D. 鼠疫和霍乱
- E. 艾滋病和霍乱

45. 急性胰腺炎假性囊肿形成的时间一般是病后( )

- A. 3~4小时
- B. 24小时
- C. 3~4天
- D. 3~4周
- E. 3~4个月

46. 根据记忆的内容，记忆可分为四种，以下哪项不是( )

- A. 感觉记忆
- B. 情绪记忆
- C. 逻辑记忆
- D. 形象记忆
- E. 运动记忆

47. 检查发现患者胸廓的前后径等于横径，肋间隙增宽，应考虑( )

- A. 扁平胸
- B. 鸡胸
- C. 正常胸廓
- D. 漏斗胸
- E. 桶状胸

48. 胸腔穿刺抽液引起急性肺水肿是由于( )

- A. 穿刺损伤肺组织
- B. 抽液过多、过快，胸内压突然下降



- C. 胸膜过敏反应
- D. 穿刺损伤肺血管
- E. 空气栓塞

49. 骨盆骨折最危险的并发症是( )

- A. 骨盆腔出血
- B. 膀胱破裂
- C. 尿道断裂
- D. 骶丛神经损伤
- E. 直肠损伤

50. 区别腹部肿块来自腹腔或腹壁, 最简易的检查方法是( )

- A. 超声检查
- B. 钡餐检查
- C. 腹部体格检查
- D. 腹部 x 线检查
- E. 胃肠镜检查

**B 型题(下列各题为公共选项型题, 每题只有一个符合题意选项。)**

**(51~53题共用选项)**

- A. 胆总管
- B. 胰管
- C. 两者均是
- D. 两者均否

51. 开口于十二指肠降部的是( )

52. 胆囊管与肝总管汇合形成( )

53. 排出胆汁的部位是( )

**(54~56题共用选项)**

- A. 心房钠尿肽
- B. 血管紧张素
- C. 醛固酮
- D. 抗利尿激素

54. 促进肾小管重吸收水的是( )

55. 促进肾小管重吸收钠的是( )

56. 抑制肾小管重吸收水、钠的是( )

**(57~58题共用选项)**

- A. 气管
- B. 食管
- C. 两者均是

- D. 两者均否
57. 通过胸廓上口的是( )
58. 相当于第10胸椎水平通过膈的是( )

**(59~61题共用选项)**

- A. 心力衰竭患者
- B. 脑栓塞患者
- C. 肠炎患者
- D. 糖尿病患者
- 下列膳食适合选项中的哪种疾病?
59. 低盐膳食适合于( )
60. 低渣膳食适合于( )
61. 定量膳食适合于( )

**(62~63题共用选项)**

- A. 低浓度给氧
- B. 高浓度给氧
- C. 两者均一
- D. 两者均否
62. 慢性支气管炎、阻塞性肺气肿、肺源性心脏病、严重呼吸衰竭宜采用( )
63. 急性呼吸窘迫综合征宜采用( )

**(64~67题共用选项)**

- A. 活动后伴疼痛性血尿
- B. 无痛性血尿
- C. 脓性血尿
- D. 乳糜尿
64. 泌尿系结石尿液是( )
65. 泌尿系结核尿液是( )
66. 泌尿系丝虫病尿液是( )
67. 泌尿系肿瘤尿液是( )

**(68~69题共用选项)**

- A. 血道播散
- B. 气道播散
- C. 两者均有
- D. 两者均无
68. 原发性肺结核的常见播散途径是( )
69. 继发性肺结核的常见播散途径是( )

**(70~73题共用选项)**

- A. 外周血白细胞增多
- B. 外周血白细胞不增多
- C. 两者均有

- D. 两者均无
70. 急性白血病可引起( )
71. 类白血病反应可引起( )
72. 慢性白血病可引起( )

**X 型题(下列各题中, 每小题均有两个或两个以上的选项符合题意。)**

73. 导尿操作, 下列哪些正确( )
- A. 男性消毒从尿道口开始
- B. 女性消毒从大腿内侧开始, 由外向内顺序进行
- C. 导尿管插入深度为2.5cm
- D. 膀胱过度充盈, 应立即插入导尿管, 快速放尿
- E. 导尿管管径大小适当, 成年男性以 F24~26为宜

74. 能使动脉血压升高的因素有( )
- A. 心率加快
- B. 呼吸变浅
- C. 外周阻力增加
- D. 每搏量减少
- E. 血管容量增加

75. 成分输血的优点包括( )
- A. 减少输血反应
- B. 减少患者心脏负担
- C. 提高治疗效果
- D. 节约血源
- E. 减低输血传染病的发生

76. 降低血清钾浓度的措施有( )
- A. 静脉滴注葡萄糖液
- B. 应用胰岛素
- C. 胰岛素、葡萄糖液同时使用
- D. 口服阳离子交换树脂
- E. 腹膜透析

77. 躯干骨包括( )
- A. 髌骨
- B. 锁骨
- C. 肋骨
- D. 胸骨
- E. 椎骨

78. 奇脉常见于下列哪些疾病( )
- A. 冠心病

- B. 心肌炎
- C. 心肌病
- D. 心包腔积液
- E. 缩窄性心包炎

79. DNA 变性时发生的变化有( )

- A. 双链解开成单链是迅速发生的
- B. 高色效应
- C. 黏度改变
- D. 共价键断裂
- E. 氢键断裂

80. 脑动脉粥样硬化时, 脑组织可发生( )

- A. 萎缩
- B. 软化
- C. 梗死
- D. 出血
- E. 增生

81. 下列哪些项目属于脑膜刺激征( )

- A. Kernig 征
- B. Lasegue 征
- C. Brudzinski 征
- D. Babinski 征
- E. Gordon 征

82. 烧伤患者的治疗原则包括( )

- A. 镇静、止痛等对症治疗
- B. 预防和治疗低血容量性休克
- C. 尽早手术治疗, 促进创面愈合
- D. 预防和治疗 MSOF
- E. 治疗局部和全身感染

83. 慢性萎缩性胃炎的病变特点是( )

- A. 腺体减少并有囊性扩张
- B. 肠腺化生
- C. 黏膜固有层内淋巴细胞、浆细胞浸润
- D. 胃穿孔
- E. 并发幽门瘢痕形成

84. 内含子是指( )

- A. hnRNA
- B. 成熟 mRNA

- C. 非编码序列
- D. 剪接中被除去的 RNA 序列
- E. 可在蛋白质生物合成过程中被表达为蛋白质的序列

85. 关于红细胞脆性的叙述, 正确的是( )

- A. 脆性越大, 在低渗盐液中抵抗力越小
- B. 脆性是抗张强度的倒数
- C. 衰老的红细胞脆性变大
- D. 脆性大的红细胞在低渗盐液中易破裂
- E. 脆性小的红细胞在低渗盐液中易破裂

86. 下列有关心脏的描述, 哪些是正确的( )

- A. 心尖由左心室构成
- B. 心底大部分由右心房构成
- C. 胸肋面大部分由右心房和右心室构成
- D. 膈面大部分由右心室构成
- E. 左缘大部分由左心室构成

87. 主诉写作要求正确的是( )

- A. 指出疾病主要属何系统
- B. 指出疾病的急性或慢性
- C. 指出疾病并发症的可能
- D. 指出疾病的发展和预后
- E. 指出疾病的持续时间

88. 下列哪些情况不能洗胃( )

- A. 幽门梗阻
- B. 腐蚀性胃炎
- C. 胃扩张
- D. 严重食管胃底静脉曲张
- E. 贲门梗阻

89. 呼吸三凹征是指吸气时下列哪些部位内陷( )

- A. 胸骨上窝
- B. 锁骨上窝
- C. 肋间肌
- D. 腹上角
- E. 肋间隙

90. 儿科特殊病史应包括( )

- A. 生产史
- B. 喂养史
- C. 生长发育史
- D. 预防接种史

E. 生活史

91. 代谢性酸中毒常见的临床表现有( )

- A. 呼吸浅慢
- B. 心肌收缩力减弱
- C. 中枢神经系统处于抑制状态
- D. 心律失常
- E. 血管对儿茶酚胺反应性增强

92. 放射性<sup>131</sup>I 治疗甲状腺功能亢进的机制包括( )

- A.  $\beta$  射线破坏甲状腺组织
- B. 破坏甲状腺血管使血流量下降, 使甲状腺缩小
- C. 破坏淋巴细胞, 减少促甲状腺素受体抗体的生成
- D. 拮抗甲状腺素
- E. 经垂体抑制 T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>分泌

93. 艾滋病的传播方式包括( )

- A. 性接触传播
- B. 注射途径
- C. 母婴传播
- D. 器官移植
- E. 人工授精

94. 有关外科手术切口感染的危险因素的描述, 正确的是( )

- A. 术前使用抗生素时间短, 感染危险性高
- B. 术前使用抗生素时间长, 感染危险性高
- C. 侵入手术切口的细菌毒力强, 感染危险性高
- D. 手术部位剃毛比剪毛的感染危险性低
- E. 术前往院时间长, 感染危险性高