

事业单位考试【护理类】模拟卷答案版

一. 单项选择题

1. 【答案】A。

解析：咀嚼肌痉挛所致牙关紧闭是最早的典型症状。注射破伤风抗毒素 1500U

2. 【答案】C。

解析：某些面部及颈部手术后的患者：可减少局部出血。

3. 【答案】ABCD。

解析：敷料应该进行压力蒸汽灭菌。橡胶类物品可通过煮沸消毒也可经过压力蒸汽灭菌法。

4. 【答案】B。

解析：室温条件：27-40℃ 湿度：40%-60%

紫外线灯 的最佳杀菌波长 254nm

关灯后灯管冷却 3-4min 再开灯或移动灯管

空气消毒照射距离小于 2 米、照射时间 30-60min

照射时间应从开灯 5-7min 后开始计算

物品消毒有效距离 25-60cm 照射时间 20-30min

若超过 1000h 及时更换灯管

紫外线灯管表面用 乙醇 棉球轻轻擦拭

5. 【答案】A。

解析：临终病人心理变化经过以下几个时期：

①否认期——拒绝接受事实。考题对应关键词：去各个医院检查

②愤怒期——为生气与愤怒。考题对应关键词：情绪发泄

③协议期——病人接受临终事实。考题对应关键词：积极配合治疗。

④忧郁期——强烈的失落感。考题对应关键词：轻生

⑤接受期——为临终的最后阶段。历年无考题

因此该患者处于忧郁期。故选 A。

6. 【答案】C。

7. 【答案】C。

解析：解析：由口腔黏膜破溃、创面上有白色膜状物附着，拭去附着物可见创面轻微出血判断，该病人可能出现念珠菌感染。这种真菌感染往往出现于口腔不洁或全身应用广谱抗生素致菌群失调或存在免疫缺陷等其他有利于该菌滋生的条件时。

溶液名称	作用
生理盐水	清洁口腔，预防感染
复方硼砂溶液（朵贝尔氏液）	轻度抑菌，除臭
1%—3% 过氧化氢溶液	防腐，防臭
1—4%碳酸氢钠溶液	属碱性药，对真菌有抑菌作用
0.02%洗必泰溶液	清洁口腔，广谱抗菌
0.02%呋喃西林溶液	清洁口腔，广谱抗菌
0.1%醋酸溶液	适用于绿脓杆菌感染
2%硼酸溶液	酸性防腐溶液，有抑制细菌作用
甲硝唑溶液	适用于

甲讨厌 醋味浓 的 臭氧

（甲：甲硝唑 厌：厌氧菌感染；）（醋：0.1%醋酸溶液 浓：绿脓杆菌感染）

（臭：防臭、防臭 氧：1%—3% 过氧化氢溶液）

8. 【答案】C。

解析：压疮共分四期

第一期（淤血红润期）考题核心关键词：红、肿、无破溃

第二期（炎性浸润期）考题核心关键词：水泡形成，极易破溃。

第三期（浅度溃疡期）考题核心关键词：大水疱，表皮破溃，黄色渗出液，感染脓性分泌物

第四期（坏死溃疡期）考题核心关键词：脓性分泌物有臭味，呈黑色。

因此该患者处压疮浅度溃疡期。故选C。

9. 【答案】E。

温度	一般病室 18~22℃，特殊病室 22~24℃
湿度	病室的相对湿度以 50%~60%为宜
通风	一般每次通风时间为 30 分钟
空间	医院病床之间的距离不得少于 1 米
音响	医院、疗养院噪音标准 35 ~ 45/dB
采光	床垫、床褥、枕芯日光暴晒 6 小时

10. 【答案】E。

11. 【答案】C。

解析：痰液常考点总结

- （1）红色——肺癌、肺吸虫、肺结核
- （2）绿色——肺部绿脓杆菌感染
- （3）铁锈色——肺炎球菌肺炎
- （4）粉红色——急性肺水肿
- （5）红色——肺癌、肺吸虫、肺结核
- （6）黑褐色——矽肺、心力衰竭
- （7）砖红色胶冻样——肺炎杆菌性肺炎

(8) 痰液分层——支气管扩张

(9) 脓臭痰——肺脓肿（厌氧菌感染）

12. 【答案】C。

解析：早产＜37 周

过期产≥42 周

足月产 妊娠满 37 周至不满 42 足月周

产褥期 产后 6 周

13. 【答案】B。

解析：传染病隔离

严密隔离	霍乱、鼠疫
呼吸道隔离	肺结核、流脑、麻疹、百日咳
肠道隔离	伤寒、细菌性痢疾、甲型肝炎
接触隔离	破伤风、气性坏疽
血液-体液隔离	乙型肝炎、艾滋病、梅毒
昆虫隔离	乙型脑炎、流行性出血热、疟疾、斑疹伤寒

14. 【答案】E。

15. 【答案】C。

解析：种休克虽然由于致休克的动因不同，在各自发生发展过程中各有特点，但微循环障碍（缺血、淤血、播散性血管内凝血）致微循环动脉血灌流不足，重要的生命器官因缺氧而发生功能和代谢障碍，是它们的共同规律，成人尿量在多少上表面休克已得到纠正 30ml/h

休克患者的脉搏特征：细弱无力休克病人的主要死亡原因是多系统器官功能衰竭 (MSOF) 多器官功能障碍中最常见的器官是：肺

16. 【答案】B。

解析：代谢性酸中毒表现为深大呼吸。

17. 【答案】A。

18. 【答案】B。

解析：大量输库存血可造成枸橼酸钠积聚，与血中游离钙结合，降低血钙，需静脉注射葡萄糖酸钙。

19. 【答案】C。

20. 【答案】D。

21. 【答案】C。

解析：真性尿失禁指膀胱完全不能储存尿液，处于空虚状态，持续发生滴尿现象。可见于昏迷病人。

假性尿失禁（充盈性尿失禁） 指膀胱充盈达一定压力时，尿液不自主的溢出或滴出。多见于前列腺增生、尿道狭窄。

压力性尿失禁 指腹部压力增加（如咳嗽、喷嚏、大笑）时出现不自主的排尿。多见于中、老年女性。

22. 【答案】D。

解析：溶血反应的阶段：①开始阶段：由于病人血浆中的凝集素和所输血中红细胞的凝集原发生凝集反应，导致红细胞凝集成团，阻塞部分小血管，从而造成组织缺血缺氧，病人表现为头胀痛、四肢麻木、胸闷、腰背部剧烈疼痛等。②中间阶段：由于凝集的红细胞发生溶解，大量的血红蛋白散布到血浆中，病人发现黄疸和血红蛋白尿（酱油色），并有寒战、高热、呼吸急促、血压下降等；③最后阶段：由于大量血红蛋白从血浆进入肾小管，遇到酸性物质变成结晶体，从而阻塞肾小管，同时由于抗原体相互作用，使肾小管内皮细胞缺血、缺氧，导致坏死脱落，进一步阻塞肾小管，病人急肾衰，表现为少尿、无尿，严重者可致死亡。

23. 【答案】A。

名称	用法	临床应用
甲醛	每 30ml 尿液中加 40%甲醛 1 滴	艾迪计数
浓盐酸	24 小时尿液中加 5~10ml	17~酮类固醇, 17 羟类固醇
甲苯	应在第一次尿液倒入后再加，每 100ml 尿液加 0.5%~1%甲苯 10ml	尿蛋白定量、尿糖定量及钠、钾、氯、肌酐、肌酸定量

24. 【答案】D。

25. 【答案】D。

解析：潮式呼吸呼吸由浅慢逐渐加快加深，又逐渐变浅变慢，暂停数秒之后，又出现上述状态的呼吸，如此周而复始。

28. 【答案】C。

解析：热疗的禁忌症有：①急性腹痛未明确诊断前，易掩盖病情；②面部危险三角区的感染（易造成颅内感染引起败血症）；③各种脏器的内出血时，会增加脏器的血流量和通透性而加重出血；④软组织损伤或扭伤早期（48 小时内），加重皮下淤血、肿胀和疼痛。

29. 【答案】B。

30. 【答案】B。

解析：意识模糊指病人有定向碍、思维和语言也不连贯，可有错觉、幻觉、躁动、精神错乱等，常见于急性重症感染的高热期。另有一种以兴奋性增高为主意识模糊，伴有知觉障碍，称为谵妄，表现为定向力丧失，感觉错乱，乱语躁动。

昏睡指近似于人事不省的意识障碍，病人处于熟睡状态，不易唤醒，虽在强烈刺激下（如压迫眶上神经）可被勉强唤醒，但很快再入睡，醒时答话含糊或答非所问。

浅昏迷指瞳孔对光反射、角膜反射、吞咽、咳嗽及各种防御反射仍存在。

深昏迷指对强烈刺激也全无反应，瞳孔散大，所有反射均消失。

31. 【答案】C。

解析：

药物	服用或灌洗溶液	禁忌药物
酸性物	镁乳、蛋清水、牛奶	强酸药物
碱性物	5%醋酸、白醋、蛋清水、牛奶	强碱药物
敌敌畏	2%~4%碳酸氢钠, 1%盐水, 1: 15000至 1: 20000 高锰酸钾洗胃	
乐果	2%~4%碳酸氢钠	高锰酸钾洗胃
灭鼠药	1: 15000 至 1: 20000 高锰酸钾, 0.5%硫酸铜	鸡蛋、牛奶、脂肪及其他油类食物

32. 【答案】A。

解析：医学上将死亡分为三期：濒死期，临床死亡期，生物学死亡期。濒死期又称临终期，此期脑干功能依然存在，表现为意识模糊或丧失，各种反射减弱或逐渐消失，肌张力减退或消失，循环功能减退，心跳减弱，血压下降，患者表现为四肢发绀，皮肤湿冷。临床死亡期是临床上判断死亡的标准，表现为心跳、呼吸完全停止，各种反射消失，瞳孔散大，但各种组织细胞仍有微弱而短暂的代谢活动。生物学死亡期是指全身器官、组织、细胞生命活动停止，也称细胞死亡。

33. 【答案】C。

解析：肺炎链球菌肺炎治疗首选的抗生素为：青霉素。支原体肺炎、军团菌首选红霉素，克雷伯杆菌首选氨基糖苷类药（记忆：支援红军送白糖）。

34. 【答案】D。

解析：II型呼衰既有缺氧，又有CO₂潴留，血气分析特点为：PaO₂<60mmHg、PaCO₂>50mmHg，原则上II型呼衰给予低浓度（<35%）持续吸氧。

35. 【答案】C。

解析：铁锈色痰是肺炎球菌性肺炎的特征性表现。

36. 【答案】D。

解析：心功能分级如下：①I级：病人患有心脏病，但活动量不受限制。②II级：心脏病病人，体力活动轻度受限。休息时无自觉症状，但在平时一般的活动下可出现上述症状。③III级：心脏病病人，体力活动明显受限。休息时无症状，小于平时一般的活动即可出现上述症状。④IV级：心脏病病人，不能从事任何体力活动。休息时也出现心力衰竭症状，体力活动后加重。

37. 【答案】A。

解析：心绞痛有三大特点：①心前区（胸骨上中段后部）压迫、紧缩样绞痛持续时间不超过15分钟；②发作前常有诱发因素，休息后绞痛逐渐缓解；③舌下含服硝酸甘油片后绞痛迅速缓解。急性心肌梗死有四大特点：①心前区心绞痛剧烈，难以忍受，常伴有烦躁不安；

②心绞痛持续时间超过 15 分钟，有的可达半小时或更长；③休息后心绞痛不减轻；④舌下含服硝酸甘油片后心绞痛不缓解。急性期心电图可见：①ST 段抬高呈弓背向上；

38. 【答案】A。

解析：高血压脑病是短时间内血压急剧升高，舒张压超过 120mmHg 或 130mmHg 并伴有中枢神经系统症状。高血压脑病是中枢神经系统功能障碍的表现脑自身的调节障碍，高血压危象是交感神经兴奋及血中儿茶酚胺类物质增多。高血压危象和高血压脑病头痛烦躁、恶心呕吐、心悸气急及视力模糊，收缩压常 > 200 mmHg，舒张压 > 120 mmHg 临床表现血压多相同。高血压危象与高血压脑病的区别，主要是中枢神经系统功能障碍的区别，有无意识障碍，如意识模糊昏迷。

39. 【答案】A。

解析：十二指肠溃疡多发生于球部，前壁较常见；胃溃疡多在胃角和胃窦小弯。

40. 【答案】D。

解析：输卵管妊娠的主要症状是停经、腹痛、阴道流血，未发生流产或破裂前，常表现为一侧下腹隐痛或酸胀感；输卵管妊娠流产或破裂时，患者突感一侧下腹撕裂样疼痛。胚胎死亡后，常有不规则阴道流血，一般不超过月经量。

先兆流产停经、阴道出血。检查：子宫正常大小，质软，宫颈黏液见典型羊齿叶状结晶。应考虑为先兆流产。

卵巢肿瘤带扭转的主要症状急性腹痛，呕吐当病人突然转身或连续旋转时，肿瘤由于偏向于身体一侧而发生蒂扭转，引起静脉回流受阻，瘤内血容量剧增或血管破裂，瘤内充满血液后致使动脉血流受阻，发生坏死、破裂或感染，表现为一侧下腹痛加剧，或一侧下腹痛伴恶心、呕吐甚至休克。

41. 【答案】A。

解析：该患者既往高血压史，目前出现颅内压增高征象，提示患者出现颅内出血，另外患者双侧瞳孔不等大，生命体征紊乱，提示患者很可能出现脑疝。颅内压增高出现头痛、呕吐(多为)和视乳头水肿 3 个主要的综合征，出现脑疝时剧烈头痛、反复呕吐、躁动不安，初期患侧动眼神经受刺激导致患侧瞳孔缩小，随病情进展，患侧动眼神经麻痹，患侧瞳孔逐渐散大。若继续恶化，相继出现双侧瞳孔散大固定，对光反射消失。

42. 【答案】C。

43. 【答案】D。

解析：脑梗死为血栓栓塞脑血管造成的，多在睡眠或安静等血流缓慢、血压降低的情况下发生，次晨发现不能说话，一次肢体瘫痪。

而脑出血多为患者在应激状态时出现。脑出血大多数在情绪激动或过分兴奋、劳累、使劲排便或脑力紧张活动时发病，突然起病，表现为剧烈头痛、头晕、呕吐，迅速出现意识障碍、昏迷等。

44. 【答案】A。

解析：脑死亡的诊断标准：深昏迷，脑干反射全部消失，无自主呼吸。以上必须全部具备。

45. 【答案】A。

46. 【答案】B。

解析：孕期自我监测：胎心音计数和胎动计数是孕妇自我监护胎儿的一种重要手段。孕妇每小时胎动数应不少于3次，12小时胎动数应不少于10次。

47. 【答案】C。

48. 【答案】E。

解析：佝偻病骨骼改变：3-6个月，颅骨软化；7-8个月，方颅，严重时呈鞍状或十字状颅形；胸廓：1岁小儿，串珠状肋，哈里森沟（横沟），重者鸡胸、漏斗胸；6个月以上可见手镯或脚镯，o形腿或x形腿。

49. 【答案】A。

解析：胎儿下降感临产前胎先露下降进入骨盆入口使宫底下降，初产妇感到上腹部较前轻松，食欲好，食量增加，呼吸轻快，尿频。

50. 【答案】D。

解析：胎盘剥离的征象有：①宫体变硬呈球形，胎盘剥离后降至子宫下段，下段被扩张，宫体呈狭长型被推向上，宫底升高达脐上；②剥离的胎盘降至子宫下段，阴道口外漏的一段脐带自行延长；③阴道少量流血；④用手掌尺侧在产妇耻骨联合上方轻压子宫下段时，宫体上升而外漏的脐带不再回缩。

51. 【答案】A

〔解析〕 因为重度二尖瓣狭窄患者左心房进左心室的血液少，所以左心室输出量低。而扩血管药物能迅速降低血压，此时的左心室泵血量有限，容易导致较严重低血压，应慎用。

52. 【答案】E

〔解析〕 病毒性肝炎可引发肝细胞变性坏死、炎症细胞浸润、肝细胞再生、间质反应性增生和小胆管增生，无小血管增生。

53. 【答案】A

〔解析〕 乙型肝炎是血液传播性疾病，主要经血（如不安全注射史等）、母婴传播及性传播，皮肤黏膜破损传播也有一定比例。

54. 【答案】B

〔解析〕 红细胞孵育渗透脆性降低常见于地中海贫血。

55. 【答案】 D

〔解析〕 孕妇破膜后为防止脐带脱垂，应选择头低足高位。

56. 【答案】 C

〔解析〕 产后应坚持母乳喂养，为预防肿胀应按需哺乳。

57. 【答案】 C

〔解析〕 对硫磷、内吸磷、敌敌畏在肝氧化后毒性反而增加。

58. 【答案】 D

〔解析〕 小剂量阿司匹林在体内具有抗血栓形成的特性，能明显减少动脉血管阻塞性血栓形成，每天服用 75~100mg 阿司匹林就可以有效地预防多数血栓性疾病，如脑梗死、心肌梗死、心绞痛等的发生。

59. 【答案】 A

〔解析〕 移行细胞癌好发于膀胱和肾盂等泌尿道黏膜处，组织学上可有不同程度的移行上皮的特点，呈浸润性生长，可由乳头状瘤恶变转化而来。移行细胞癌的癌细胞不形成角化珠，形成角化珠是鳞状细胞癌的特点。

60. 【答案】 D

〔解析〕 凝胶过滤又称分子筛层析，蛋白质溶液加于柱之顶部，任其往下渗漏，小分子蛋白质进入孔内，因而在柱中滞留时间较长，大分子蛋白质不能进入孔内而径直流出，因此不同大小的蛋白质得以分离。

二. 多项选择题

1. 【答案】ABC。

解析：大出血多表现为细脉或丝脉。

2. 【答案】ABCDE。

3. 【答案】ABCD。

解析：低钾血症典型的心电图改变为早期出现 T 波降低或倒置，随后出现 ST 段降低，QT 间期延长和 U 波出现。

4. 【答案】AC。

解析：

骨折部位	瘀斑部位	脑脊液漏	可能损伤的脑神经
颅前窝	“熊猫眼征”，“兔眼征”	鼻漏	嗅神经和视神经
颅中窝	耳后乳突区	耳、鼻漏	面神经和听神经
颅后窝	耳后及枕下部	耳后及枕部	舌咽神经、迷走神经、副神经、舌下神经

5. 【答案】BC。

解析：急性乳腺炎最常见的原因是乳汁淤积，急性乳腺炎最主要的致病菌为金黄色葡萄球菌。

6. 【答案】BD。

解析：酒精拭浴前先置冰袋于头部，以助降温并防止由于拭浴时表皮血管收缩，血液集中到头部引起充血。

②拭浴后半小时测体温，如体温降至 39℃ 以下，应取下头部冰袋。另外应在全身各部位拭浴完毕后，穿好衣服，取下热水袋。

③促进足底局部末梢血管扩张，避免一过性冠状动脉收缩。

7. 【答案】ABCDE。

8. 【答案】ABCD。

9. 【答案】ACD。

解析：确定胃管在胃内的方法：一抽（抽取胃液）；二听（听气过水声）；三气泡（呼气时，胃管末端放入水中无气泡冒出）。

10. 【答案】BCD。

解析：正常新生儿出生体重超过 2500g。

11. 【答案】AC

〔解析〕多囊卵巢综合征的主要临床表现为月经失调（表现为月经稀发、经量过少或闭经）、不孕（排卵障碍引起）、多毛和（或）痤疮、肥胖和黑棘皮症等。

12. 【答案】ABDE

〔解析〕婴儿胃呈水平位；新生儿贲门括约肌发育不成熟；婴儿肠道相对较长；婴儿肠道固定性较差。

13. 【答案】ABC

〔解析〕急性肾盂肾炎、急性尿道炎及急性细菌性膀胱炎均有尿频、尿急、尿痛，并且实验室检查都可见尿中有红细胞、白细胞，且尿细菌培养有大肠埃希菌；泌尿性结核和膀胱结石也有膀胱刺激征，尿检查有红、白细胞，但膀胱结石尿细菌培养无大肠埃希菌，泌尿性结核尿细菌培养无大肠埃希菌，有结核分枝杆菌。

14. 【答案】ABC

〔解析〕化脓性关节炎早期表现为发热、畏寒、高热、乏力、纳差等全身中毒症状以及关节疼痛，局部肿胀和肢体活动受限等症状；X 线检查在早期仅见关节间隙变宽，较晚期间隙变窄，晚期关节破坏，关节间隙消失等表现；化脓性关节炎治疗时可加用非类固醇抗炎药物，但必须用抗生素治疗数天后才能加用；风湿性关节炎使用非甾体抗炎药物治疗。

15. 【答案】ABCE

〔解析〕新生儿溶血病的临床特点：黄疸、肝脾肿大、发热、贫血、胎儿水肿，严重者出现胆红素脑病；另外，ABO 血型不合临床溶血症状较轻，个别较重。Rh 血型不合者溶血多严重，出现严重贫血、水肿、肝脾肿大、心力衰竭，甚至死胎。故 Rh 溶血临床表现比 ABO 血型不合溶血病更严重。

16. 【答案】 ACDE

〔解析〕 本题考查雾化器的使用，使用雾化器时应先接通电源，再调整雾化器，雾化吸入时患者应闭口深呼吸，治疗毕先关雾化器再关电源。水槽内水量不足时，及时加入冷蒸馏水，禁止加入温水、热水或生理盐水。

17. 【答案】 ABC

〔解析〕 急性血源性骨髓炎症状：局部红、肿、热，有压痛，皮肤红肿明显，并可出现波动、功能受限，以及假瘫，可转化为慢性骨髓炎。

18. 【答案】 ACDE

〔解析〕 减轻心脏负荷的措施包括：①根据病情适当安排生活、劳动和休息，避免激动；②控制钠盐摄入及血压；③合理应用利尿剂；④合理应用血管扩张剂。

19. 【答案】 BD

〔解析〕 输卵管绝育术适应证：①夫妻双方已有子女不愿再生育；②因某种疾病，如心脏病、肾病、肝病及严重遗传疾病不宜生育。

20. 【答案】 ABCE

〔解析〕 新生儿臀红的预防：不可垫塑料布，以免引起臀红；勤换尿布；大便后用温水洗净臀部；包裹不可过松、过紧；避免尿液和粪便长时间刺激。

21. 【答案】 ABCD

〔解析〕 基本措施有：（1）积极消除病因；（2）补充血容量；（3）纠正酸中毒；（4）血管活性药物的应用；（5）糖皮质激素和其他药物的应用；（6）治疗 DIC，改善微循环；（7）保护脏器功能；（8）各型休克的处理。

22. 【答案】 ABCD

〔解析〕 消化性溃疡并发症有出血（黑便、呕血、周围循环衰竭、休克）、穿孔、幽门梗

阻、癌变。

23. 【答案】ABDE

〔解析〕 低钾血症病人补钾原则：（1）口服补钾，10%氯化钾溶液 10 毫升，每日 3 次；（2）不能口服者静脉点滴，切忌静脉直接推注；（3）浓度不过高，不超过 0.3%；（4）速度不过快，每分钟不宜超过 80 滴；（5）见尿补钾，尿量超过每小时 30 毫升才能补钾；（6）总量不过量，每日补氯化钾 4—5 克，最多不超过 6—8 克。

24. 【答案】ABCDE

〔解析〕 疾病是在一定病因作用下自稳调节紊乱而发生的异常生命活动过程，并引发一系列代谢、功能、结构的变化，表现为症状、体征和行为的异常。题中所述均为疾病的内容。

25. 【答案】AC

〔解析〕 压力造成的生理反应有心跳加快、胃肠反应（腹泻）、头痛、灰发等。

26. 【答案】ABCE

〔解析〕 预防切口感染首先要改善病人的体质，术中严格无菌操作，正确的缝合技术等，对可能污染的伤口常规预防性使用抗生素，所以未使用抗生素不是形成切口感染的原因。伤口愈合慢（伤口血肿、组织切除过多等）常会造成感染。

27. 【答案】BCE

〔解析〕 急性乳腺炎病因有：（1）乳汁淤积：乳头发育不良、乳汁过多或婴儿吸入过少不能完全排空、乳管不通影响排乳。（2）细菌入侵：婴儿口含乳头睡眠易造成乳头破损或皲裂，使婴儿口腔细菌沿淋巴管入侵造成乳腺感染。

28. 【答案】AC

〔解析〕 颅前窝骨折：鼻漏，嗅、视神经损伤，眶周皮下及球结膜下淤血斑，“熊猫眼”征、“兔眼”征；颅中窝骨折：耳、鼻、咽部漏，面、听神经损伤，耳后、乳突部淤血斑。

29. 【答案】ABCD [

解析] 冷疗法的目的及适应症：(1) 减轻局部充血或出血：踝关节扭伤 48h 内、鼻出血、扁桃体摘除术后可用冷湿敷；(2) 减轻疼痛：牙痛、烫伤的疼痛和软组织损伤早期所致的疼痛；(3) 控制炎症扩散：鼻腔部位软组织发炎早期，可控制炎症扩散；(4) 降低体温：高热。

30. 【答案】AB

[解析] 结核分枝杆菌可通过呼吸道、消化道或皮肤损伤侵入易感机体，引起多种组织器官的结核病。

三. 判断题

1. 【答案】√

2. 【答案】√。

3. 【答案】√。

4. 【答案】√。

5. 【答案】×。解析：细菌型痢疾患者宜用肠道隔离，严密隔离适用于霍乱、鼠疫。

6. 【答案】√

7. 【答案】√

8. 【答案】×

9. 【答案】×

10. 【答案】√